

| | |
|--------|----------|
| 診療科 | 血液内科 |
| レジメン名称 | R-CHOP療法 |
| パスID | 00001186 |
| 1クール | 21日間 |
| 最大クール数 | 8回まで |

備考
 プレドニン 50mg/m² po day1~5
 前投薬としてブルフェン・ポララミン内服

レジメン内容

| 投与順 | 薬剤名 | 投与量 | 上限値 | 投与方法 | 投与時間 | Day |
|-----|---|--------------------------------|-------------------------|---------------|--------|-----|
| | | | | | | 1 |
| 1 | ソルテム3A輸液/500mL1袋 水溶性プレドニン20mg | 1袋 0A | | 持続 点滴静注 | 4時間で | 1回 |
| 2 | ソルテム1輸液/500mL1袋 | 1袋 | | 持続 点滴静注 | 4時間で | 1回 |
| 3 | 生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m | 1本 | | 点滴静注 | 0.5時間で | 1回 |
| 4 | リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイサー」 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500mL/ | 375 mg/m ² 0 mL | 412.5 mg/m ² | 点滴静注 | 4時間で | 1回 |
| 5 | グラネセロン静注液3mgシリンジ「サワイ」 | 1本 | | 静脈注射 (ワンショット) | | 1回 |
| 6 | 注射用エンドキサン100mg 生理食塩液ハック「フー」/250mL1袋(2 | 750 mg/m ² 1袋 | 825 mg/m ² | 点滴静注 | 1時間で | 1回 |
| 7 | トキルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 生理食塩液PL「フー」/20mL1管(20mL/ | 50 mg/m ² 1A | 55 mg/m ² | 静脈注射 (ワンショット) | | 1回 |
| 8 | オンコピン注射用1mg 生理食塩液PL「フー」/20mL1管(20mL/ | 1.4 mg/m ² 10 mL | 2 mg | 静脈注射 (ワンショット) | | 1回 |