

|        |              |
|--------|--------------|
| 診療科    | 血液内科         |
| レジメン名称 | FCR療法（1コース目） |
| パスID   | 00001187     |
| 1クール   | 28日間         |
| 最大クール数 | 1回まで         |

備考  
 点滴の場合：フルダラ 25mg/m<sup>2</sup> div d1-3  
 内服の場合：フルダラ 40mg/m<sup>2</sup>  
 内服の場合：エンドキサン250mg/m<sup>2</sup>

レジメン内容

| 投与順 | 薬剤名  | 投与量                           | 上限値                     | 投与方法    | 投与時間   | Day |    |    |
|-----|--|-------------------------------|-------------------------|---------|--------|-----|----|----|
|     |  |                               |                         |         |        | 1   | 2  | 3  |
| 1   | ソルテム3A輸液/500mL1袋                                     | 1袋                            |                         | 持続 点滴静注 | 5時間で   | 1回  |    |    |
| 2   | ソル・コチフ注射用100mg<br>大塚生食注TN/50mL1キット                   | 1 vial<br>1本                  |                         | 点滴静注    | 0.5時間で | 1回  |    |    |
| 3   | リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイサ-」<br>生理食塩液ハック「フソ-」/250mL1袋(2) | 375 mg/m <sup>2</sup><br>0 mL | 412.5 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注    | 4時間で   | 1回  |    |    |
| 4   | 注射用エンドキサン100mg<br>生理食塩液ハック「フソ-」/250mL1袋(2)           | 250 mg/m <sup>2</sup><br>1袋   | 275 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注    | 1時間で   | 1回  | 1回 | 1回 |