

診療科	血液内科
レジメン名称	R-ESHAP療法 (Carbo)
パスID	00001189
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

※シスプラチンをカルボプラチンへ変更することあり (R-CarboESHAP)
 カルボプラチン用量=5×(GFR+25)/4mgを1日量とする
 ※リツキシマブ投薬前処方(ブレンテキマブ、ホリミンなど)あり
 ※イトホシド濃度が<0.4mg/dLになるよう輸液量調整
 ※高齢者では各々70-80%に減量する

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day					
						1	2	3	4	5	6
1	ソルテム3A輸液/500mL1袋	1袋		持続 点滴静注	6時間で	1回	1回	1回	1回	1回	1回
2	ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL)	1袋		持続 点滴静注	6時間で	1回	1回	1回	1回	1回	1回
3	ソルテム3A輸液/500mL1袋	1袋		持続 点滴静注	6時間で	1回	1回	1回	1回	1回	1回
4	ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL)	1袋		持続 点滴静注	6時間で	1回	1回	1回	1回	1回	1回
5	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/)	375 mg/m2 0 mL	412.5 mg/m2	点滴静注	4時間で	1回					
6	ゲラニセトロン静注3mgシリンジ「サワイ」 ソル・マトロール静注用500mg 大塚生食注TN/50mL1キット	1本 1 vial 1本		点滴静注	30分で		1回	1回	1回	1回	1回
7	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	25 mg/m2 120 mg	27.5 mg/m2 200 mg	持続 点滴静注	24時間で		1回	1回	1回	1回	
8	イトホシド点滴静注液100mg「サント」 大塚糖液5%/5%250mL1袋	40 mg/m2 1袋	44 mg/m2	点滴静注	1時間で		1回	1回	1回	1回	
9	ゲラニセトロン静注3mgシリンジ「サワイ」	1本		静脈注射(ワンショット)			1回	1回	1回	1回	
10	シタビピン点滴静注液400mg「NIG」 ソルテム1輸液/500mL1袋	2000 mg/m2 300 mL	2200 mg/m2	点滴静注	2時間で						1回