

診療科	血液内科
レジメン名称	R-CODOX-M療法
パスID	00001190
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

IVAC療法と交互に繰り返す（R-CODOX-M/IVAC療法として）
65歳以上はMTXを1g/m²に減量。MTXは10%量を1hrで投与。残りを23hrで持続投与。腫瘍量の多い症例ではCHOP療法ないしPSL0.5mg-1mg/kgの先行投与を行う。R I Tはday6以降に腫瘍崩壊のリスクを鑑みて併用（特に初回治療時）

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ソルテム1輸液/500mL1袋	1 袋		持続 点滴静注	8時間で	1回	1回	1回	1回	1回	1回		1回		1回				
2	ソルテム3A輸液/500mL1袋	1 袋		持続 点滴静注	8時間で	1回	1回	1回	1回	1回	1回		1回		1回				
3	ソルテム1輸液/500mL1袋	1 袋		持続 点滴静注	8時間で	1回	1回	1回	1回	1回	1回		1回		1回				
4	グレースロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1 本		静脈注射（ワンショット）		朝	朝	朝	朝	朝					朝.夕	朝			
5	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶（100m	1 本		点滴静注	1時間で	1回	1回	1回	1回	1回									
6	注射用エンドキサン100mg 生理食塩液バッグ「フソ-」/250mL1袋（2	800 mg/m2 1 袋	880 mg/m2	点滴静注	1時間で	1回													
7	ドキルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶（100m	40 mg/m2 1 本	44 mg/m2	点滴静注	30分で	1回													
8	オノピン注射用1mg 生理食塩液PL「フソ-」/20mL1管（20ml/	1.5 mg/m2 10 mL	2 mg	静脈注射（ワンショット）		1回							1回						
9	和サド注20mg 水溶性ブドニオン20mg 生理食塩液PL「フソ-」/20mL1管（20ml/	40 mg 1 A 3 mL	40 mg	髄腔内注射		1回		1回											
10	注射用エンドキサン100mg 生理食塩液バッグ「フソ-」/250mL1袋（2	200 mg/m2 1 袋	220 mg/m2	点滴静注	1時間で		1回	1回	1回	1回									
11	リツキマフBS点滴静注100mg「ファイサ-」 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶（500ml/	375 mg/m2 0 mL	412.5 mg/m2	点滴静注	4時間で						1回								
12	注射用メトトレキセート5mg 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶（100m	300 mg/m2 1 本	330 mg/m2	点滴静注	1時間で										1回				
13	注射用メトトレキセート5mg 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶（500ml/	1200 mg/m2 1 本	2970 mg/m2	点滴静注	11時間で										1回				
14	注射用メトトレキセート5mg 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶（500ml/	1500 mg/m2 1 本	2970 mg/m2	点滴静注	12時間で										1回				
15	注射用メトトレキセート5mg 水溶性ブドニオン10mg 生理食塩液PL「フソ-」/20mL1管（20ml/	15 mg 1 A 5 mL	15 mg	髄腔内注射															

15
1回