

診療科	血液内科
レジメン名称	R-IVAC療法
パスID	00001191
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

- ・CODOX-M療法と交互に2回繰り返す（R-CODOX-M/IVAC療法として）
- ・65歳以上は体イト[®] 1g/m²、キロイト[®] 1g/m²に減量
- ・イト[®] シド[®] 濃度が<0.4mg/dLになるよう輸液量調整

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day					
						1	2	3	4	5	6
1	ソルテ [®] Δ3A輸液/500mL1袋 メイロン静注7%/20mL1管	1 袋 1 A		持続 点滴静注	6時間で	1回	1回	1回	1回	1回	1回
2	ハルマン輸液pH8「NP」(500mL) メイロン静注7%/20mL1管	1 袋 1 A		持続 点滴静注	6時間で	1回	1回	1回	1回	1回	1回
3	ソルテ [®] Δ3A輸液/500mL1袋 メイロン静注7%/20mL1管	1 袋 1 A		持続 点滴静注	6時間で	1回	1回	1回	1回	1回	1回
4	ハルマン輸液pH8「NP」(500mL) メイロン静注7%/20mL1管	1 袋 1 A		持続 点滴静注	6時間で	1回	1回	1回	1回	1回	1回
5	ゲラネセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1 本		静脈注射 (ワンショット)		朝	朝	朝	朝	朝	
6	生理食塩液PL「フソー」/100mL1瓶(100m)	1 本		点滴静注	1時間で	1回	1回	1回	1回	1回	
7	注射用体イト [®] 1g 生理食塩液パッック「フソー」/250mL1袋(2)	1.5 g/m ² 1 袋	1.65 g/m ²	点滴静注	1時間で	1回	1回	1回	1回	1回	
8	ウロミキサン注100mg	0 A		静脈注射 (ワンショット)		1回	1回	1回	1回	1回	
9	ウロミキサン注100mg	0 A		静脈注射 (ワンショット)		1回	1回	1回	1回	1回	
10	ウロミキサン注100mg	0 A		静脈注射 (ワンショット)		1回	1回	1回	1回	1回	
11	イト [®] シド [®] 点滴静注液100mg「サント」 大塚糖液5%/5%250mL1袋	60 mg/m ² 1 袋	66 mg/m ²	点滴静注	1時間で	1回	1回	1回	1回	1回	
12	シタビ [®] 点滴静注液400mg「N1G」 ソル・コテフ注射用100mg ソルテ [®] Δ1輸液/500mL1袋	2000 mg/m ² 1 vial 300 mL	2200 mg/m ²	点滴静注	2時間で	10:00	10:00				
13	ゲラネセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」 シタビ [®] 点滴静注液400mg「N1G」 ソル・コテフ注射用100mg ソルテ [®] Δ1輸液/500mL1袋	1 本 2000 mg/m ² 1 vial 300 mL	2200 mg/m ²	静脈注射 (ワンショット) 点滴静注		夕	夕				
14	シタビ [®] 点滴静注液400mg「N1G」 ソル・コテフ注射用100mg ソルテ [®] Δ1輸液/500mL1袋	2000 mg/m ² 1 vial 300 mL	2200 mg/m ²	点滴静注	2時間で	20:00	20:00				
15	注射用メトトレキサート5mg 水溶性ブドウ糖10mg 生理食塩液PL「フソー」/20mL1管(20ml/)	15 mg 1 A 5 mL	15 mg	髄腔内注射						1回	
16	リツキシマ [®] BS点滴静注100mg「ファイザー」 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500ml/)	375 mg/m ² 0 mL	412.5 mg/m ²	点滴静注	4時間で						1回