

診療科	血液内科
レジメン名称	APL寛解導入療法（高リスク）
パスID	00000120
1クール	15日間
最大クール数	制限無し

備考

- ★ATRA内服併用（d1-36）
- ★イマチーンは61-70歳で9mg/m<sup>2</sup>、71歳以上で6mg/m<sup>2</sup>へ減量
- ★トリセノックスはd36まで投与（適宜レジメンを継続する）
- ★ATRA、トリセノックスを3日以上休薬したときは、day36以降に追加投与を行う。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ソルテム3A輸液/500mL1袋	1 袋		持続 点滴静注	5時間で	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回
2	ソルテム1輸液/500mL1袋	1 袋		持続 点滴静注	5時間で	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回
3	生理食塩液PL「フソ」/20mL1管 (20ml/	5 mL		静脈注射（ワンショット）		終了時	終了時	終了時	終了時	終了時	終了時	終了時	終了時	終了時	終了時	終了時	終了時	終了時	終了時
4	ゲラネトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1 本		静脈注射（ワンショット）		1回			1回		1回		1回	1回	1回	1回	1回	1回	1回
5	イマチーン静注用5mg 光糖液5%/5%100mL1瓶 大塚蒸留水/20mL1管	12 mg/m <sup>2</sup> 1 本 1 A	13 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分で		1回		1回		1回		1回						
6	生理食塩液バック「フソ」/250mL1袋 (2 トリセノックス点滴静注12mg/6mL	1 袋 0.1 mg/Kg	0.2 mg/Kg	点滴静注	1.5時間で									1回	1回	1回	1回	1回	1回

15
1回
1回
終了時
1回
1回