

診療科	血液内科
レジメン名称	ESHAP療法 (Carbo)
パスID	00000131
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

※シス<sup>®</sup>ラチンをカルボ<sup>®</sup>ラチンへ変更することあり (CarboESHAP)  
 カルボ<sup>®</sup>ラチン用量=5×(GFR+25)/4mgを1日量とする  
 ※イト<sup>®</sup>シド<sup>®</sup>濃度が<0.4mg/dLになるよう輸液量調製  
 ※高齢者では各々70-80%に減量する

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day			
						1	2	3	4
1	ソルテ <sup>®</sup> M3A輸液/500mL1袋	1 袋		持続 点滴静注	6時間で	1回	1回	1回	1回
2	ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL)	1 袋		持続 点滴静注	6時間で	1回	1回	1回	1回
3	ソルテ <sup>®</sup> M3A輸液/500mL1袋	1 袋		持続 点滴静注	6時間で	1回	1回	1回	1回
4	ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL)	1 袋		持続 点滴静注	6時間で	1回	1回	1回	1回
5	ゲ <sup>®</sup> ラネセロン静注液3mgシリンジ「サワイ」 ソル <sup>®</sup> マト <sup>®</sup> ロール静注用125mg 大塚生食注TN/50mL1キット	1 本 0 vial 1 本		点滴静注	30分で	1回	1回	1回	1回
6	シス <sup>®</sup> ラチン点滴静注10mg「マルコ」 カルボ <sup>®</sup> ラチン点滴静注液50mg「NK」	25 mg/m2 100 mg	27.5 mg/m2 200 mg	持続 点滴静注	24時間で	1回	1回	1回	1回
7	シタビ <sup>®</sup> ン点滴静注液400mg「NIG」 ソルテ <sup>®</sup> M1輸液/500mL1袋	2000 mg/m2 300 mL	2200 mg/m2	点滴静注	*点滴速度 0mL/hr				
8	イト <sup>®</sup> シド <sup>®</sup> 点滴静注液100mg「サント」 大塚糖液5%/5%250mL1袋	40 mg/m2 1 袋	44 mg/m2	点滴静注	1時間で	1回	1回	1回	1回
9	ゲ <sup>®</sup> ラネセロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1 本		静脈注射 (ワンショット)		1回	1回	1回	1回