

診療科	血液内科
レジメン名称	BEACOPP
パスID	00000145
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考
増量BEACOPPとして、イントキサン1200mg/m²、ドキルビン35mg/m²、イトホシト[®] 200mg/m²とすることもあり。
イトホシト[®]の濃度は、<0.4mg/dLになるよう輸液量調整
オコピンはmax2mg

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day								
						1	2	3	4	5	6	7	8	
1	ソルテム3A輸液/500mL1袋	1袋		持続点滴静注	8時間で	1回	1回	1回						1回
2	ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL)	1袋		点滴静注	8時間で	1回	1回	1回						1回
3	ソルテム3A輸液/500mL1袋	1袋		持続点滴静注	8時間で	1回	1回	1回						1回
4	ゲラセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1本		静脈注射(ワンショット)		1回	1回	1回						
5	注射用イントキサン100mg 生理食塩液パック「フソー」/250mL1袋(2	650 mg/m ² 1袋	1312 mg/m ²	点滴静注	1時間で	1回								
6	ドキルビン塩酸塩注射用10mg「NK」 生理食塩液PL「フソー」/20mL1管(20ml/	25 mg/m ² 1A	38.5 mg/m ²	静脈注射(ワンショット)		1回								
7	イトホシト [®] 点滴静注液100mg「サント」 光糖液5%/5%500mL1瓶	100 mg/m ² 1本	220 mg/m ²	点滴静注	2時間で	1回	1回	1回						
8	生理食塩液PL「フソー」/100mL1瓶(100m	1本		点滴静注	15分で	1回								
9	ゲラセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1本		静脈注射(ワンショット)										1回
10	ブレ注射用5mg ソル・コート注射用100mg 生理食塩液パック「フソー」/250mL1袋(2	10 mg/m ² 1 vial 1袋	11 mg/m ²	点滴静注	2時間で									1回
11	オコピン注射用1mg 生理食塩液PL「フソー」/20mL1管(20ml/	1.4 mg/m ² 10 mL	2 mg	静脈注射(ワンショット)										1回