

診療科	血液内科
レジメン名称	ポライビー+R-CHP療法
パスID	00001487
1クール	21日間
最大クール数	6回まで

備考

プレドニン 50mg/m<sup>2</sup> po day1~5  
前投薬としてブルフェン・ポララミン内服など

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	ソルテム3A輸液/500mL1袋 水溶性プレドニン20mg	1袋 0A		持続 点滴静注	4時間で	1回
2	ソルテム1輸液/500mL1袋	1袋		持続 点滴静注	4時間で	1回
3	グラネセロン静注液3mgシリンジ「サワイ」 デキサート注射液1.65mg(0.5ml/管) ホウラン注5mg 大塚生食注TN/50mL1キット	1本 2A 1A 1本		点滴静注	0.5時間で	1回
4	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	1本		点滴静注	0.5時間で	1回
5	リツキマフBS点滴静注100mg「ファイサー」 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500ml/)	375 mg/m <sup>2</sup> 0 mL	412.5 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	4時間で	1回
6	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	0.5時間で	1回
7	ポライビー点滴静注用30mg 大塚蒸留水/20mL1管 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	1.8 mg/Kg 1A 1本	2 mg/Kg	点滴静注	1.5時間で	1回
8	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	0.5時間で	1回
9	注射用エンドキサン100mg 生理食塩液パック「フソ-」/250mL1袋(2)	750 mg/m <sup>2</sup> 1袋	825 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間で	1回
10	トキルビシン塩酸塩注射液10mg「NK」 生理食塩液PL「フソ-」/20mL1管(20ml/)	50 mg/m <sup>2</sup> 1A	55 mg/m <sup>2</sup>	静脈注射 (ワンシヨット)		1回