

| | |
|--------|----------------------|
| 診療科 | 血液内科 |
| レジメン名称 | DBd療法（ダラキューロ）4～8サイクル |
| パスID | 00001519 |
| 1クール | 21日間 |
| 最大クール数 | 制限無し |

備考

☆レナデックス20mg/日をday1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12内服併用
☆前処置で、ステロイド、アセトアミノフェン、抗ヒスタミン剤（抗ロイコトリエン剤）などを1～3時間前に投薬

レジメン内容

| 投与順 | 薬剤名 | 投与量 | 上限値 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------|-----------------------|----------|------|-----|---|---|----|---|---|---|----|---|----|----|----|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | ダラキューロ配合皮下注 | 15 mL | 20 mL | 皮下注射(SC) | | 1回 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 生理食塩液PL「フジ」/20mL1管(20ml/ ホルゾミブ注射用3mg「トワ」 | 1.2 mL 1.3 mg/m ² | 1.5 mg/m ² | 皮下注射(SC) | | 1回 | | | 1回 | | | | 1回 | | | | 1回 |