

診療科	血液内科
レジメン名称	血球貪食症候群（VP-16初期治療） 5-6w目
パスID	00000371
1クール	28日間
最大クール数	1回まで

備考
 テガトロン 10mg/m²po又はdiv（連日投与で2週間ごとに減量10→5→2.5→1.25）連日1-8週目
 血球減少強い時（好中球<500の時など）はイトホシドは投与しない。シクロホリン 6mg/kg po
 （2×）連日1-8週目 血中濃度目標200μg/L 適宜バクタ・抗真菌剤・γ-グロブリンなどを予防投与。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day								
						29	30	31	32	33	34	35	36	
1	ゲラネトロン静注3mgシリンジ「サワイ」	1本		静脈注射（ワンショット）		1回								1回
2	イトホシド点滴静注100mg「サント」 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶（500ml）	150 mg/m ² 0 mL	165 mg/m ²	持続 点滴静注	2.5時間で	1回								1回
3	水溶性プレドニソン10mg 注射用メトトレキサート5mg 生理食塩液PL「フジ」/20mL1管（20ml）	1A 12 mg 0 mL	12 mg	髄腔内注射		1回								1回