

診療科	血液内科
レジメン名称	CNS原発悪性リンパ腫（若年者用）：寛解導入
パスID	00000844
1クール	14日間
最大クール数	制限無し

備考
 ☆奇数回はプロカルパジン（内服） 50mg/m² day 1～7 併用
 ☆60歳未満
 ☆MTX血中濃度により、ロイコボリン増量規程あり

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day						
						1	2	3	4	5	6	
1	ソル・コ・テフ注射用100mg アタラクス-P注射液(25mg/ml) 大塚生食注TN/50mL1キット	1 vial 1 A 1 本		点滴静注	0.5時間で	1回						
2	フルセ生食/500mL1袋(500ml/袋) リツキマブ [®] BS点滴静注100mg「ファイザー」	1 袋 375 mg/m ²	410 mg/m ²	点滴静注	3時間で	1回						
3	ゲラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1 本		静脈注射（ワンショット）			1回					
4	注射用メトトレキサート5mg フルセ生食/1L1袋(1000ml/袋)	3500 mg/m ² 1 袋	3800 mg/m ²	点滴静注	6時間で		1回					
5	オゾン [®] 注射用1mg 生理食塩液PL「フソー」/20mL1管(20ml/	1.4 mg/m ² 10 mL	2 mg	静脈注射（ワンショット）			1回					
6	ロイコ [®] リン注3mg 大塚生食注TN/50mL1キット	10 A 1 本		点滴静注	0.5時間で			4回	4回			
7	ロイコ [®] リン注3mg 大塚生食注TN/50mL1キット	10 A 1 本		点滴静注	0.5時間で					06:00, 12:00		
8	注射用メトトレキサート5mg キロサイト [®] 注20mg 水溶性ブレトニン20mg 生理食塩液PL「フソー」/20mL1管(20ml/	10 mg 30 mg 1 A 3.5 mL	10 mg 300 mg	髄腔内注射								1回