

| | |
|--------|----------|
| 診療科 | 血液内科 |
| レジメン名称 | A-AVD療法 |
| パスID | 00000873 |
| 1クール | 28日間 |
| 最大クール数 | 6回まで |

備考

- ダカルバジンは副作用が強いときは、250mg/m²も可
- イメンド使用も考慮
- 2週間以内に抗癌剤投与するが、ジーラスタを併用する

レジメン内容

| 投与順 | 薬剤名 | 投与量 | 上限値 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|-------------------------|--------------|--------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ソルテム3A輸液/500mL1袋 | 1袋 | | 持続 点滴静注 | 4時間で | 1回 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | デキサメタゾン注射液1.65mg(0.5ml/管) パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ」 大塚生食注TN/50mL1キット | 1A 1本 1本 | | 点滴静注 | 30分で | 1回 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ダカルバジン注用100 生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m) 大塚蒸留水/20mL1管 | 375 mg/m ² 1本 1A | 412.5 mg/m ² | 点滴静注 | 1.5時間で | 1回 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ドキルビシン塩酸塩注射液10mg「NK」 生理食塩液PL「フソ」/20mL1管(20ml/) | 25 mg/m ² 0A | 27.5 mg/m ² | 静脈注射(ワンショット) | | 1回 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | エカール注射液10mg 生理食塩液PL「フソ」/20mL1管(20ml/) | 6 mg/m ² 0A | 6.6 mg/m ² | 静脈注射(ワンショット) | | 1回 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ボラミン注5mg 大塚生食注TN/50mL1キット | 1A 1本 | | 点滴静注 | 30分で | 1回 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 生理食塩液PL「フソ」/20mL1管(20ml/) | 1A | | 静脈注射(ワンショット) | | 1回 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 7-テトリシ点滴静注用50mg 大塚蒸留水/20mL1管 生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m) | 1.2 mg/Kg 1A 1本 | 1.3 mg/Kg | 点滴静注 | 1時間で | 1回 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 大塚生食注TN/50mL1キット | 1本 | | 点滴静注 | 10分で | 1回 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ジーラスタ皮下注3.6mg | 1本 | | 皮下注射(SC) | | | 1回 | | | | | | | | | | | | |

| 15 | 16 |
|----|----|
| 1回 | |
| 1回 | |
| 1回 | |
| 1回 | |
| 1回 | |
| 1回 | |
| 1回 | |
| | |
| 1回 | |
| | |
| | 1回 |