

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 診療科    | 血液内科            |
| レジメン名称 | ガザイバ単独（・先行投与）療法 |
| パスID   | 00000875        |
| 1クール   | 7日間             |
| 最大クール数 | 制限無し            |

備考

- \* 要前投薬：経口解熱剤（アセトアミノフェン）±抗ヒスタミン剤±ステロイド（2回目以降、適宜確認）
- \* インラインフィルター使用

レジメン内容

| 投与順 | 薬剤名   | 投与量                  | 上限値     | 投与方法    | 投与時間 | Day |
|-----|---|----------------------|---------|---------|------|-----|
|     |   |                      |         |         |      | 1   |
| 1   | ソルテム3A輸液/500mL1袋  | 1 袋                  |         | 持続 点滴静注 | 4時間で | 1回  |
| 2   | ソルテム3A輸液/500mL1袋  | 1 袋                  |         | 持続 点滴静注 | 4時間で | 1回  |
| 3   | メルブレード <sup>TM</sup> ニゾロンコハク酸エステルNa注射用4ボ <sup>TM</sup> ラミン注5mg<br>生理食塩液PL「フソー」/100mL1瓶(100m | 2 vial<br>1 A<br>1 本 |         | 点滴静注    | 30分で | 1回  |
| 4   | ガザイバ <sup>TM</sup> 点滴静注1000mg<br>生理食塩液パ <sup>TM</sup> ック「フソー」/250mL1袋(2                     | 1000 mg<br>210 mL    | 1000 mg | 点滴静注    | 4時間で | 1回  |