

診療科	血液内科
レジメン名称	G-トリアキシン療法
パスID	00000877
1クール	28日間
最大クール数	6回まで

備考  
濾胞性リンパ腫など  
1 サイクル目はday1, 8, 15に、2サイクル目以降はday1に  
前投薬は適宜確認

レジメン内容

投与 順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day	
						1	2
1	ソルテム1輸液/500mL1袋	1 袋		持続 点滴静注	4時間で	1回	
2	ソルテム1輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	4時間で	1回	
3	デキサト注射液6.6mg (2ml/瓶) ホラミン注5mg 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶 (100m	2 vial 1 A 1 本		点滴静注	1時間で	1回	
4	グラネセトン静注液3mgシリンジ「サワイ」	1 本		静脈注射 (ワンショット)		1回	
5	トリアキシン点滴静注液100mg/4mL 大塚生食注TN/50mL1キット	90 mg/m2 50 mL	99 mg/m2	点滴静注	10分で	1回	
6	ガザイハ点滴静注1000mg 生理食塩液パック「フソ-」/250mL1袋 (2	1000 mg 210 mL	1000 mg	点滴静注	4時間で	1回	
7	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶 (100m	1 本		点滴静注	1時間で	1回	
8	ソルテム1輸液/500mL1袋	1 袋		持続 点滴静注	3時間で		1回
9	グラネセトン静注液3mgシリンジ「サワイ」 デキサト注射液1.65mg (0.5ml/管) 大塚生食注TN/50mL1キット	1 本 2 A 1 本		点滴静注	1時間で		1回
10	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶 (100m	1 本		点滴静注	1時間で		1回
11	トリアキシン点滴静注液100mg/4mL 大塚生食注TN/50mL1キット	90 mg/m2 50 mL	99 mg/m2	点滴静注	10分で		1回