

診療科	呼吸器内科
レジメン名称	CBDCA+PEM+nivolumab+ipilimumab (無)
パスID	00001068
1クール	21日間
最大クール数	1回まで

備考  
2クール目(ヤープイなし)  
\* 適応疾患: 非小細胞肺癌(特に非扁平上皮癌)  
☆肝・腎機能、骨髄機能等によって、投与量は適宜検討  
AUC=4~6で適宜調節(血液毒性がGrade3以上で減量)  
アリムタも適宜増減する場合あり

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/)	1本		点滴静注	3時間で	1回
2	デキサメタゾン注射液1.65mg(0.5ml/管)	3A		点滴静注	30分で	1回
	アロキサ点滴静注235mg	1 vial				
	パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ」	1本				
3	生理食塩液パッカ「フソ」/250mL1袋(2	1袋		点滴静注	5分で	1回
	大塚生食注TN/50mL1キット	1本				
4	オプジーブ点滴静注20mg	360 mg	360 mg	点滴静注	30分で	1回
	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m	1本				
5	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	30分で	1回
6	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m	1本		点滴静注	10分で	1回
	ヘムレキト点滴静注液100mg「NK」	500 mg/m2	550 mg/m2			
7	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	5分で	1回
8	生理食塩液パッカ「フソ」/250mL1袋(2	1袋		点滴静注	1時間で	1回
	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	5 mg (AUC)	6.6 mg (AUC)			