

診療科	呼吸器内科
レジメン名称	CBDCA+PTX+nivolumab+ipilimumab (無)
パスID	00001071
1クール	21日間
最大クール数	1回まで

備考

未治療の進行肺扁平上皮癌に対するレジメン。
☆前投薬としてボララミン注5mg静注、ファモチジン注20mg静注、DEX20mg静注あり。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	フルモ生食/500mL1袋(500ml/袋)	1袋		点滴静注	3時間で	1回
2	デキサト注射液6.6mg(2ml/瓶) ファモチジン静注液20mg「サワイ」 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m) ホウラミン注5mg	3 vial 1 A 1 本 1 A		点滴静注	30分で	1回
3	ケラセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」 アロカス点滴静注235mg 生理食塩液パック「フソ-」/250mL1袋(2)	1 本 1 vial 1 袋		点滴静注	30分で	1回
4	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で	1回
5	オプジーボ点滴静注20mg 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	360 mg 1 本	360 mg	点滴静注	30分で	1回
6	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	30分で	1回
7	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500ml/)	200 mg/m2 1 本	220 mg/m2	点滴静注	3時間で	1回
8	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	15分で	1回
9	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 大塚糖液5%/5%250mL1袋	5 mg(AUC) 1 袋	6.6 mg(AUC)	点滴静注	1時間で	1回