

診療科	呼吸器内科
レジメン名称	split PE+durvalumab
パスID	00001462
1クール	21日間
最大クール数	4回まで

備考

当レジメン4コース施行後、イミフィンジ単剤（SCLC）へ以降することあり

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day				
						1	2	3	4	5
1	アロカス点滴静注235mg デキサート注射液6.6mg(2ml/瓶) パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ」 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ 生理食塩液「ヒカリ」/250mL1袋(2 イミフィンジ点滴静注120mg	1 vial 1 vial 1 本 1 本		点滴静注	1時間で	1回				
2	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ イミフィンジ点滴静注120mg	1 袋 1500 mg	1500 mg	点滴静注	60分で	1回				
3	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で	1回				
4	イトホシト点滴静注液100mg「サント」 光糖液5%/5%500mL1瓶	80 mg/m2 1 本	88 mg/m2	点滴静注	2時間で	1回				
5	スプラチン点滴静注10mg「マルコ」 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ 大塚生食注TN/50mL1キット	25 mg/m2 1 本 1 本	28 mg/m2	点滴静注	1時間で	1回				
6	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で	1回				
7	ソルテム3A輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	1.5時間で	1回				
8	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 5mL	1 本		静脈注射(ワンショット)		1回				
9	デキサート注射液6.6mg(2ml/瓶) 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ イトホシト点滴静注液100mg「サント」 光糖液5%/5%500mL1瓶	1 vial 1 本 1 本		点滴静注	1時間で		1回	1回		
10	イトホシト点滴静注液100mg「サント」 光糖液5%/5%500mL1瓶	80 mg/m2 1 本	88 mg/m2	点滴静注	2時間で		1回	1回		
11	スプラチン点滴静注10mg「マルコ」 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ 大塚生食注TN/50mL1キット	25 mg/m2 1 本 1 本	28 mg/m2	点滴静注	1時間で		1回	1回		
12	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で		1回	1回		
13	ソルテム3A輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	1.5時間で		1回	1回		
14	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 5mL	1 本		静脈注射(ワンショット)			1回	1回		
15	ソルテム3A輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	1.5時間で				1回	1回
16	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ イトホシト点滴静注液100mg「サント」 光糖液5%/5%500mL1瓶	1 本 1 本		点滴静注	1.5時間で				1回	1回