

診療科	呼吸器内科
レジメン名称	CDDP+VP-16(short hydration)
パスID	00001591
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

ED-SCLCへの化学療法。放射線併用でも使用することあり。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day		
						1	2	3
1	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/ 硫酸Mg補正液1mEq/mL	1本 0.5A		点滴静注	1時間で	1回		
2	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	5分で	1回		
3	デキサト注射液6.6mg(2ml/瓶) デキサト注射液1.65mg(0.5ml/管) アロカス点滴静注235mg パロセトン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ」 生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m	1 vial 2 A 1 vial 1本 1本		点滴静注	30分で	1回		
4	イトホシト点滴静注液100mg「サント」 光糖液5%/5%500mL1瓶	100 mg/m2 1本	110 mg/m2	点滴静注	90分で	1回		
5	ソルテム3A輸液/500mL1袋	1袋		点滴静注	1時間で	1回		
6	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/	80 mg/m2 1本	88 mg/m2	点滴静注	1時間で	1回		
7	フロセミド注20mg「トワ」	1 A		静脈注射(ワンショット)		1回		
8	ソルテム3A輸液/500mL1袋	1袋		点滴静注	1時間で	1回		
9	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ5mL	1本		静脈注射(ワンショット)		1回		
10	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	5分で		1回	1回
11	デキサト注射液6.6mg(2ml/瓶) 生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m	1 vial 1本		点滴静注	30分で		1回	1回
12	イトホシト点滴静注液100mg「サント」 光糖液5%/5%500mL1瓶	100 mg/m2 1本	110 mg/m2	点滴静注	90分で		1回	1回
13	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	5分で		1回	1回
14	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ5mL	1本		静脈注射(ワンショット)			1回	1回