

診療科	呼吸器内科
レジメン名称	PEM+pembrolizumab (維持療法)
パスID	00000887
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

* 適応疾患：非小細胞肺癌（特に非扁平上皮癌）

☆肝・腎機能、骨髄機能等によって、投与量は適宜検討。
イレッサを併用する場合あり

★キイトル-ダ[®]+CBDCA+PEM (MAX4クール)→維持 キイトル-ダ[®]+PEM

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/	1本		点滴静注	2時間で	1回
2	キイトル-ダ [®] 点滴静注100mg 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	200 mg 1本	200 mg	点滴静注	30分で	1回
3	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	5分で	1回
4	デキサト注射液6.6mg(2ml/瓶) 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1 vial 1本		点滴静注	30分で	1回
5	ヘマトレキド [®] 点滴静注液100mg「NK」 生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	500 mg/m2 1本	550 mg/m2	点滴静注	10分で	1回
6	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	30分で	1回