

診療科	脳神経外科
レジメン名称	メトトレキサート・ロイコホリン救援療法
パスID	00000204
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

ロイコホリンはメトトレキサート投与後3時間より3hr毎計9回その後6hr毎計8回
 ※メトトレキサート投与後48時間の血中濃度が0.000001M以上ならば利尿を図り、ロイコホリンを増量する
 ※骨髄抑制が顕著なら、G-CSF製剤の投与と次コースの延期を図る
 メトトレキサートは80mg/kgでも行うことあり。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day			
						1	2	3	4
1	注射用メトトレキサート5mg 生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/)	2000 mg/m ² 1本	2200 mg/m ²	点滴静注	3時間で	14:00			
2	ロイコホリン注3mg	10 A		静脈注射 (ワンショット)		20:00	20:00	20:00	20:00
3	ロイコホリン注3mg	10 A		静脈注射 (ワンショット)		23:00	23:00	23:00	23:00
4	ロイコホリン注3mg	10 A		静脈注射 (ワンショット)		02:00	02:00	02:00	02:00
5	ロイコホリン注3mg	10 A		静脈注射 (ワンショット)		05:00	05:00	05:00	05:00