

診療科	消化器内科
レジメン名称	IRI+S-1+アバスチン(ベバシズマブ)
パスID	00001249
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

3週毎レジメン  
IRI 150mg/m<sup>2</sup> day1  
ベバシズマブ7.5mg/kg  
(初回90分、2回目60分、3回目以降30分に短縮可)  
TS-1 day1(夕)~day15(朝)  
80mg (BSA<1.25m<sup>2</sup>、100mg (1.25m<sup>2</sup>≤BSA<1.50m<sup>2</sup>)、120mg (1.50≤BSA)

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1本		ポート用(中心静脈注射)	5時間で	1回
2	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1本		ポート用(中心静脈注射)	30分で	1回
	デキスト注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 vial				
	アロカス点滴静注235mg	1 vial				
3	パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「ト-ワ	1本		ポート用(中心静脈注射)	90分で	1回
	ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一・	7.5 mg/Kg	8.25 mg/Kg			
4	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1本		ポート用(中心静脈注射)	2時間で	1回
	カンブ点点滴静注40mg	150 mg/m <sup>2</sup>	165 mg/m <sup>2</sup>			
	光糖液5%/5%500mL1瓶	1本				