

診療科	消化器内科
レジメン名称	CAPOX+ビロイ(胃癌)初回(入院)
パスID	00001604
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

カペシタビン2000mg/m²/日 p.o. day1(夕)~day15(朝)
※ビロイ投与中嘔吐/悪心があれば投与中断。15分症状持続する場合はプリンペラン1A静注またはアタラックスP25mg点滴後、さらに15分経過観察。回復すれば50mg/m²/hrで再開し、15分後100mg/m²/hrへ。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	1本		点滴静注	5時間で	1回
2	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	1本		点滴静注	30分で	1回
	デキスト注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 vial				
	デキスト注射液1.65mg(0.5ml/管)	2 A				
	アロカス点滴静注235mg	1 vial				
3	ビロイ点滴静注用100mg	800 mg/m ²	880 mg/m ²	点滴静注	*点滴速度 0mL/hr	1回
	テルモ生食/1L1袋(1000ml/袋)	1袋				
4	大塚蒸留水/20mL1管	4 A		点滴静注	30分で	1回
	大塚生食注TN/50mL1キット	1本				
5	光糖液5%/5%500mL1瓶	1本		点滴静注	2時間で	1回
	エルゾラット点滴静注液100mg	130 mg/m ²	143 mg/m ²			