

診療科	消化器内科
レジメン名称	CAPOX+ビロイ(胃癌)2回目以降(外来)
パスID	00001606
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考

カペシタビン 2000mg/m²/日 p.o. day1(夕)~day15(朝)
 ※ビロイ投与中嘔吐/悪心があれば投与中断。15分症状持続する場合はプリンペラン1A静注またはアタラックスP25mg1A点滴後、さらに15分経過観察。回復すれば50mg/m²/hrで再開し、15分後75mg/m²/hrへ。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100mL)	1本		点滴静注	5時間で	1回
2	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100mL)	1本		点滴静注	30分で	1回
	デキスト注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 vial				
	アロカス点滴静注235mg	1 vial				
	パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「ト-ワ	1本				
	ホ-ラミン注5mg	1A				
	デキスト注射液1.65mg(0.5ml/管)	2A				
3	ビロイ点滴静注用100mg	600 mg/m ²	660 mg/m ²	点滴静注	*点滴速度 QmL/hr	1回
	生理食塩液「ヒカリ」/500ml1瓶(500ml/大塚蒸留水/20mL1管)	1本 2A				
4	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	30分で	1回
5	光糖液5%/5%500mL1瓶	1本		点滴静注	2時間で	1回
	エルゾラット点滴静注液100mg	130 mg/m ²	143 mg/m ²			