

診療科	消化器内科
レジメン名称	FOLFOX+ビロイ(胃癌)初回(入院)
パスID	00002135
1クール	14日間
最大クール数	1回まで

備考

ビロイ投与中嘔吐/悪心があれば投与中断。15分症状持続する場合はプリンペラン1A静注またはアタラックスP25mg点滴後、さらに15分経過観察。回復すれば50mg/m²/hrで再開し、15分後100mg/m²/hrへ。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day 1
1	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m	1本		点滴静注	5時間で	1回
2	デキスト注射液6.6mg(2ml/瓶) デキスト注射液1.65mg(0.5ml/管) アロカス点滴静注235mg パロメトロン点滴静注パツグ0.75mg/50m ホラミン注5mg	1 vial 2 A 1 vial 1 袋 1 A		点滴静注	30分で	1回
3	ビロイ点滴静注用100mg テルモ生食/1L1袋(1000ml/袋) 大塚蒸留水/20mL1管	800 mg/m ² 1 袋 4 A	880 mg/m ²	点滴静注	*点滴速度 0mL/hr	1回
4	大塚生食注TN/50mL1キット	1本		点滴静注	5分で	1回
5	大塚糖液5%/5%250mL1袋 エルブラット点滴静注液100mg	1 袋 85 mg/m ²	93.5 mg/m ²	点滴静注	2時間で	1回
6	大塚糖液5%/5%250mL1袋 レボネリナート点滴静注用100mg「NK」 レボネリナート点滴静注用25mg「NK」	1 袋 0 vial 0 vial		点滴静注	2時間で	1回
7	フルオウラシル注250mg「トワ」 光糖液5%/5%100mL1瓶	400 mg/m ² 50 mL	440 mg/m ²	点滴静注	5分で	1回
8	フルオウラシル注250mg「トワ」 生理食塩液PL「フソ」/20mL1管(20ml/	2400 mg/m ² 0 mL	2640 mg/m ²	点滴静注	46時間で	1回
9	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ5mL	1本		静脈注射(ワンショット)		1回