

診療科	消化器内科
レジメン名称	FOLFOX+ビロイ(胃癌)2回目以降(外来)
パスID	00002137
1クール	14日間
最大クール数	制限無し

備考

ビロイ投与中嘔吐/悪心があれば投与中断。15分症状持続する場合はプリンベラン1A静注またはアタラックスP25mg点滴後、さらに15分経過観察。回復すれば50mg/m²/hrで再開し、15分後100mg/m²/hrへ。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液PL「ツー」/100mL1瓶(100mL)	1 本		点滴静注	5時間で	1回
2	デキサート注射液6.6mg(2mL/瓶) デキサート注射液1.65mg(0.5mL/管) アロカリス点滴静注235mg ハロセトロン点滴静注パック 0.75mg/50mL ホラミン注5mg	1 vial 2 A 1 vial 1 袋 1 A		点滴静注	30分で	1回
3	ビロイ点滴静注用100mg 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500mL)/ 大塚蒸留水/20mL1管	400 mg/m ² 1 本 2 A	440 mg/m ²	点滴静注	*点滴速度 0mL/hr	1回
4	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		点滴静注	5分で	1回
5	大塚糖液5%/5%250mL1袋 エルフ ラット点滴静注液100mg	1 袋 85 mg/m ²	93.5 mg/m ²	点滴静注	2時間で	1回
6	大塚糖液5%/5%250mL1袋 レボホリナート点滴静注用100mg「NK」 レボホリナート点滴静注用25mg「NK」	1 袋 0 vial 0 vial		点滴静注	2時間で	1回
7	フルオウラシル注250mg「トーキ」 光糖液5%/5%100mL1瓶	400 mg/m ² 50 mL	440 mg/m ²	点滴静注	5分で	1回
8	フルオウラシル注250mg「トーキ」 生理食塩液PL「ツー」/20mL1管(20mL)/	2400 mg/m ² 0 mL	2640 mg/m ²	点滴静注	46時間で	1回
9	ヘバフラッシュ100単位/mLシリング 5mL	1 本		静脈注射(ワンショット)		1回