

診療科	消化器内科
レジメン名称	CPT-11+CDDP (NEC)
パスID	00000242
1クール	28日間
最大クール数	制限無し

備考
CPT-11+CDDP

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ソルテ [®] M3A輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	1.5時間で	1回													
2	テルモ生食/500mL1袋(500ml/袋)	1 袋		点滴静注	1.5時間で	1回													
3	デキザト注射液1.65mg(0.5ml/管)	2 A		点滴静注	30分で	1回													
	デキザト注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 vial																	
	アロカス点滴静注235mg	1 vial																	
	大塚生食注2本 [®] -ト100mL	1 本																	
	パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ	1 本																	
4	カンブ [®] ト点滴静注40mg 光糖液5%/5%500mL1瓶	60 mg/m2 1 本	66 mg/m2	点滴静注	1.5時間で	1回													
5	シス [®] ラチン点滴静注10mg「マルコ」 テルモ生食/500mL1袋(500ml/袋)	60 mg/m2 300 mL	60 mg/m2	点滴静注	2時間で	1回													
6	フロセミ [®] 注20mg「トーワ」	1 A		静脈注射(ワンショット)		1回													
7	テルモ生食/500mL1袋(500ml/袋)	1 袋		点滴静注	2時間で	1回													
8	ソルテ [®] M3A輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	2時間で	1回													
9	ソルテ [®] M3A輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	2時間で	1回													
10	デキザト注射液1.65mg(0.5ml/管)	2 A		点滴静注	30分で									1回					
	デキザト注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 vial																	
	生理食塩液PL「フジ」/100mL1瓶(100m	1 本																	
	パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ	1 本																	
11	カンブ [®] ト点滴静注40mg 光糖液5%/5%500mL1瓶	60 mg/m2 1 本	66 mg/m2	点滴静注	1.5時間で									1回					
12	生理食塩液PL「フジ」/100mL1瓶(100m	1 本		点滴静注	10分で									1回					

15
1回
1回
1回