

診療科	消化器内科
レジメン名称	BV+mFOLF0X6 (大腸)
パスID	00000247
1クール	14日間
最大クール数	制限無し

備考

ベパシマブ：初回投与は90分かけてdiv、2回目は60分でも可。それ以降は30分でも可。5-FU：2400mg/m<sup>2</sup>(48hr)は、インフューザーポンプを使用して2.2mL/hrで投与  
外科レジメンと同じ。放射線も併用することあり。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m	1本		点滴静注	10分で	1回
2	アロカス点滴静注235mg	1 vial		点滴静注	30分で	1回
	グラネセロン静注3mgシリンジ「サワイ」	1本				
	デキスト注射液6.6mg(2mL/瓶)	1 vial				
	生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m	1本				
3	ベパシマブBS点滴静注100mg「第一・生理食塩液PL「フー」/100mL1瓶(100m	5 mg/Kg 1本	5.5 mg/Kg	点滴静注	90分で	1回
4	エルブラット点滴静注液100mg 大塚糖液5%/5%250mL1袋	85 mg/m <sup>2</sup> 1袋	93.5 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間で	1回
5	シホネリナト点滴静注用100mg「NK」	0 vial		点滴静注	2時間で	1回
	シホネリナト点滴静注用25mg「NK」	0 vial				
	大塚糖液5%/5%250mL1袋	1袋				
6	フルオウテシル注250mg「トーワ」 光糖液5%/5%100mL1瓶	400 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	440 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	5分で	1回
7	フルオウテシル注250mg「トーワ」 生理食塩液PL「フー」/20mL1管(20mL/	2400 mg/m <sup>2</sup> 0 mL	2640 mg/m <sup>2</sup>	持続 点滴静注	46時間で	1回