

診療科	消化器内科
レジメン名称	BV+FOLFIRI
パスID	00000248
1クール	14日間
最大クール数	制限無し

備考

ベバシマブ：初回投与は90分かけてdiv、2回目は60分でも可。それ以降は30分でも可。5-FU：2400mg/m²(48hr)は、インフューザーポンプを使用して2.2mL/hrで投与
外科レジメンと同じ。放射線も併用することあり。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1本		点滴静注	10分で	1回
2	アロカス点滴静注235mg	1 vial		点滴静注	30分で	1回
	デキサト注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 vial				
	パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ	1本				
3	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1本		点滴静注	90分で	1回
	ベバシマブBS点滴静注100mg「第一・	5 mg/Kg	5.5 mg/Kg			
4	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m	1本		点滴静注	2時間で	1回
	カンブト点滴静注40mg	150 mg/m ²	165 mg/m ²			
5	光糖液5%/5%500mL1瓶	1本		点滴静注	2時間で	1回
	レボネリナト点滴静注用100mg「NK」	0 vial				
	レボネリナト点滴静注用25mg「NK」	0 vial				
6	大塚糖液5%/5%250mL1袋	1袋		点滴静注	5分で	1回
	フルオウテシル注250mg「トワ」	400 mg/m ²	440 mg/m ²			
7	光糖液5%/5%100mL1瓶	50 mL		持続 点滴静注	46時間で	1回
	フルオウテシル注250mg「トワ」	2400 mg/m ²	2640 mg/m ²			
	生理食塩液PL「フソ-」/20mL1管(20ml/	0 mL				