診療科	消化器内科
レジメン名称	CDGP+5FU+RT (食道)
パスID	00000444
1クール	28日間
最大クール数	制限無し

備考 腎機能悪化時

## レジメン内容

投与	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day		
順	未 <b>州</b> 石	仅分里	비개			1	2	3
1	テルモ生食/1L1袋(1000ml/袋)	1 袋		中心静脈注射	3時間で	1回		
4	大塚生食注2ポート100mL	1 本		中心静脈注射	30分で	1回		
	デキサート注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 vial						
	デキサート注射液1.65mg(0.5ml/管)	2 A						
	<u>パロノセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ</u>	1 本						
3	大塚生食注TN/50mL1キット	1 本		中心静脈注射	5分で	1回		
	フロセミド注20mg   トーワ」	1 A						
"	光糖液5%/5%500mL1瓶	1 本		中心静脈注射	24時間で	1回		
	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	800 mg/m2	880 mg/m2		- 1.03 [0.3]			
	テルモ生食/500mL1袋(500ml/袋)	1 袋		中心静脈注射	1 5時間で	1回		
	アクブラ静注用10mg	90 mg/m2	99 mg/m2					
	テルモ生食/1L1袋(1000ml/袋)	1 袋		中心静脈注射	6時間で	10		
	光糖液5%/5%500mL1瓶	1 本		中心静脈注射			1回	1回
	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	800 mg/m2	880 mg/m2					
8	ハルトマン輸液pH8「NP」(500mL)	1 袋		中心静脈注射	4時間で		2回	2回
	生理食塩液PL「フソー」/100mL1瓶(100m	1 本		中心静脈注射	30分で		1回	1回
	デキサート注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 vial			0071			