

診療科	消化器内科
レジメン名称	mFOLFIRINOX
パスID	00000913
1クール	14日間
最大クール数	制限無し

備考

膵癌
高度催吐性リスクに分類されるため、アロカリス使用。

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day
						1
1	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	1本		点滴静注	*点滴速度 0mL/hr	1回
2	アロカリス点滴静注235mg	1 vial		点滴静注	30分で	1回
	デキサト注射液1.65mg(0.5ml/管)	2 A				
	デキサト注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 vial				
	パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「ト-ワ」	1本				
	生理食塩液PL「フソ-」/100mL1瓶(100m)	1本				
3	エルゾラット点滴静注液100mg 大塚糖液5%/5%250mL1袋	85 mg/m2 1袋	93.5 mg/m2	点滴静注	2時間で	1回
4	シホネリナト点滴静注用100mg「NK」	0 vial		点滴静注	2時間で	1回
	シホネリナト点滴静注用25mg「NK」	0 vial				
	大塚糖液5%/5%250mL1袋	1袋				
5	カンブ点点滴静注40mg 大塚糖液5%/5%250mL1袋	150 mg/m2 1袋	165 mg/m2	点滴静注	1.5時間で	1回
6	フルオウラシル注250mg「ト-ワ」 生理食塩液PL「フソ-」/20mL1管(20ml/	2400 mg/m2 20 mL	2640 mg/m2	ポート用(中心静脈注射)	46時間で	1回