

| | |
|--------|------------|
| 診療科 | 消化器内科 |
| レジメン名称 | FOLFIRINOX |
| パスID | 00000945 |
| 1クール | 14日間 |
| 最大クール数 | 制限無し |

備考

膀胱癌
高度催吐性リスクに分類されるため、アロカリス使用。

レジメン内容

| 投与順 | 薬剤名 | 投与量 | 上限値 | 投与方法 | 投与時間 | Day |
|-----|---|---------------------------------------|------------|--------------|--------|-----|
| | | | | | | 1 |
| 1 | アロカリス点滴静注235mg デキサト注射液1.65mg(0.5ml/管) デキサト注射液6.6mg(2ml/瓶) パロセトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トワ」 生理食塩液PL「フジ」/100mL1瓶(100m | 1 vial 2 A 1 vial 1 本 1 本 | | 点滴静注 | 30分で | 1回 |
| 2 | エルブラット点滴静注液100mg 光糖液5%/5%500mL1瓶 | 85 mg/m2 1 本 | 93.5 mg/m2 | 点滴静注 | 2時間で | 1回 |
| 3 | シホホリナート点滴静注用100mg「NK」 シホホリナート点滴静注用25mg「NK」 大塚糖液5%/5%250mL1袋 | 0 vial 0 vial 1 袋 | | 点滴静注 | 2時間で | 1回 |
| 4 | カンフト点滴静注40mg 大塚糖液5%/5%250mL1袋 | 180 mg/m2 1 袋 | 198 mg/m2 | 点滴静注 | 1.5時間で | 1回 |
| 5 | フルオウテシル注250mg「トワ」 光糖液5%/5%100mL1瓶 | 400 mg/m2 50 mL | 440 mg/m2 | 点滴静注 | 5分で | 1回 |
| 6 | フルオウテシル注250mg「トワ」 生理食塩液PL「フジ」/20mL1管(20ml/ | 2400 mg/m2 20 mL | 2640 mg/m2 | ポート用(中心静脈注射) | 50時間で | 1回 |