

診療科	泌尿器科
レジメン名称	TIP療法 陰茎癌
パスID	00000787
1クール	21日間
最大クール数	制限無し

備考
陰茎癌
レスタミン（パクリタキセル投与30分前に内服）
イメンド（シスプラチン投与1.5時間前に内服）

レジメン内容

投与順	薬剤名	投与量	上限値	投与方法	投与時間	Day			
						1	2	3	4
1	カ ⁺ インド輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	2時間で	1回	1回	1回	
2	生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500ml/ 注射用体イト [®] 1g	1 本 1 g/m2	2.2 g/m2	点滴静注	2時間で	1回	1回	1回	
3	ウロキサン注100mg 大塚生食注TN/50mL1キット	5 A 1 本		点滴静注	0.5時間で	3回	3回	3回	
4	生理食塩液PL「フソ」/100mL1瓶(100m デキサル注射液6.6mg(2ml/瓶) フマキソン静注液20mg「サワイ」	1 本 1 vial 1 A		点滴静注	0.5時間で	1回			
5	パ ⁺ クリタキセル注30mg/5mL「NK」 生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500ml/	175 mg/m2 1 本	275 mg/m2	点滴静注	3時間で	1回			
6	大塚生食注TN/50mL1キット パ ⁺ ロ/セトロン静注0.75mg/2mLシリンジ「トーワ	1 本 1 本		点滴静注	0.5時間で	1回			
7	20%マンニトール注射液「YD」300mL	1 袋		点滴静注	1時間で	1回	1回	1回	
8	生理食塩液「ヒカリ」/500mL1瓶(500ml/ シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	1 本 20 mg/m2	27.5 mg/m2	点滴静注	2時間で	1回	1回	1回	
9	ソルデ [®] M3A輸液/500mL1袋	1 袋		点滴静注	5時間で	1回	1回	1回	
10	大塚生食注TN/50mL1キット デキサル注射液6.6mg(2ml/瓶)	1 本 1 vial		点滴静注	0.5時間で		1回	1回	
11	バルトマン輸液pH8「NP」(500mL)	1 袋		点滴静注	5時間で				2回